



FERTILIZANTE LÍQUIDO

DESCRIPCIÓN:

PRUDENCE G47 es una mezcla de hormonas, que se puede aplicar en los cultivos, para inducir la división y elongación celular, importante como inductor de desarrollo y crecimiento de los frutos, tallos y brotes. PRUDENCE G47 previene y controla la formación de Russet, Roseteado o Roña fisiológica de las manzanas cuando es aplicado en aplicaciones foliares o aspersiones de post-floración.

Para la uva de mesa se recomienda hacer aplicaciones al momento de la formación de los racimos foliares para inducir un alargamiento de los racimos. También se hacen aplicaciones después del amarre de frutos para inducir el alargamiento o tamaño de las bayas.

En los cultivos de zarzamora y frambuesa se utiliza para inducir un mayor número de cargadores o tallos y flores. El con los efectos de PRUDENCE G47 podemos obtener mayores cosechas y mejor calidad de los frutos en general.

PRUDENCE G47 puede ser aplicado en forma foliar directamente a las plantas, para balancearse, lo que se manifiesta en un mejor rendimiento de las plantas.

COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN	% EN PESO/ VOLUMEN
ÁCIDO GIBERELICO	1.0 %
NITRÓGENO	2.1 %
DILUYENTES	96.9 %

DOSIS Y APLICACIONES

La presentación líquida de **PRUDENCE G47** le permite ser aplicado fácilmente en cualquier etapa del cultivo. Siempre asegurándose de que se aplique con suficiente agua para lograr una buena cobertura.

La dosis es de 0.5 a 1.0 litros por hectárea y se repite cada 10 a 15 días hasta completar 4 aplicaciones. Se recomienda aplicar **PRUDENCE G 47** cuando la temperatura ambiental sea superior a los 12° c y no rebase los 32° c

Cultivo	DOSIS ml./100Litros.	Observaciones
Cebolla	50 - 70	A los 45 días después del trasplante y repetir cada 15 días durante el ciclo.
Ajo	50 - 70	A los 45 días después del trasplante y repetir cada 15 días durante el ciclo.
Fresa	60- 80	A los 45 días después del trasplante y repetir cada 7 a 10 días durante el ciclo.
Frambuesa y Zarzamora Arándanos	80- 125	A los 45 días después del trasplante y repetir cada 7 a 10 días durante el ciclo.
Vid	60- 80	Al momento que inicia la floración y repetir a los 10 a 12 días.
Rosa	100- 125	Antes de la floración y repetir cada 7 a 10 días en ciclo.
Manzana	100- 125	Al momento que inicia la floración y repetir cuando inicia desarrollo de frutos cada 10 a 12 días hasta completar 4 aplicaciones

FORMULADO POR:

