



# RootPrimer



## DESCRIPCIÓN:

**ROOT PRIMER** es una mezcla de hormonas, para aplicarse en los cultivos, para inducir la formación y desarrollo del sistema radicular de las plantas.

La falta un sistema radicular adecuado es un problema mucho más común de lo que imaginamos. una gran diversidad de problemas pueden disminuir, alterar o modificar el desarrollo del sistema radicular de los cultivos tales como la compactación del suelo, clima, mal manejo de la humedad, variedad equivocada, fertilización mal aplicada etc.

Cuando se induce un desarrollo vigoroso de las raíces, los cultivos responden con un desarrollo de la parte aérea de las plantas, para balancearse, lo que se manifiesta en un mejor rendimiento de las plantas. otro efecto que se manifiesta por un mayor sistema radicular, es la mayor absorción de nutrientes.

Dentro de las ventajas que ofrece el uso de **ROOT PRIMER** son:

- Mayor vigor y desarrollo radicular y vegetativo.
- Aumenta la calidad y rendimientos de las cosechas.
- Aumento de resistencia y capacidad de recuperación a las condiciones de estrés.
- Mejor utilización de los fertilizantes y agua.

## COMPOSICIÓN

	% EN PESO/ VOLUMEN
NITRÓGENO TOTAL .....	8.0 %
FÓSFORO .....	3.8 %
POTASIO .....	2.0 %
COMPLEJO HORMONAL .....	0.65 %
VITAMINAS .....	4.5 %
AMINOÁCIDOS .....	3.4 %
MATERIA ORGÁNICA .....	7.0 %
DILUYENTE .....	70.65 %

## DOSIS Y APLICACIONES:

La presentación líquida de **ROOT PRIMER** le permite ser aplicado en cualquier tipo de riego (goteo, aspersión, etc.) y en cualquier etapa del cultivo. siempre asegurándose de que se aplique con suficiente agua para lograr una buena cobertura del sistema radicular.

Se recomienda aplicar **ROOT PRIMER** cuando la temperatura ambiental sea superior a los 12° c

CULTIVO	DOSIS Lt./ Ha.	OBSERVACIONES
<b>Cucurbitáceas</b> Melón, Calabaza Sandía, Pepino	0.5 - 1.0	Al momento del trasplante y repetir cada 15 días durante el ciclo.
Tomates y Chiles	1.0	Al momento del trasplante y repetir cada 15 días durante el ciclo.
Cebolla	0.5 - 1.0	Al momento del trasplante y repetir cada 15 días durante el ciclo.
Ajo	0.5 - 1.0	Cuando aparezcan las primeras 2 hojas verdaderas y repetir cada 30-40 días.
Fresa	1.0	Después del trasplante y repetir después de los flujos de floración.
Frambuesa, Zarzamora Arándanos	1.0 - 2.0	Al momento del trasplante y repetir después de flotación y podas.
Vid	2.0 - 3.0	Al momento que inicia la brotación después de la dormancia y repetir a los 15 días.
<b>Frutales Perennes:</b> Aguacate, Mango, Papaya Platano	2.0 - 3.0	Antes de la floración y repetir 6 veces en ciclo.
<b>Frutales Caducifolios:</b> Manzana, Durazno, Pera, Nogal	2.0 - 3.0	Al momento que inicia la brotación después de la dormancia y repetir cuando inicia desarrollo de frutos.

FORMULADO POR:

